

GMALL Register

Registerstudie

Einschluss: ALL, NK-Zell-Lymphom/Leukämie, akute biphänotypische Leukämie/akute bilineäre Leukämie

Non Hodgkin Lymphom (Burkitt-Lymphom, DLBCL, B-lymphoblastisches Lymphom, T-lymphoblastisches Lymphom, Großzellig-anaplastisches Lymphom)
≥ 18 Jahre

1. LINIE

GMALL Evolve Phase 2

ED Ph+ ALL

Alter 18-50 Jahre, ECOG ≤ 2

normale QTcF ≤450ms (Männer) ≤470ms (Frauen)

RI: Induktion + Kons & Imatinib vs.

Induktion + Kons & Ponatinib

RII: 1. molCR

A: HSCT vs. B: CTX + TKI + Blinatumomab

2. molFAIL/molNE

C: Blinatumomab + TKI dann HSCT

2. LINIE

GMALL Bliven Phase 1/2

r/r B Zell Vorläufer akute lymphoblastische
Leukämie, molekularer MRD Marker vorhanden
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG ≤ 2

Venetoclax, Blinatumomab

Ausschluss: BCR-ABL, Burkitt, extramedulläres
Rezidiv, ZNS-Beteiligung

KONTAKT STUDIENZENTRUM

Katharina Fehringer

Tel.Nr.: -1261, Katharina.Fehringer@mri.tum.de

Mandeep Kaur

Tel.Nr.: -8174, Mandeep.Kaur@mri.tum.de