

Follikuläres Lymphom

MorningLyte Phase 3
untreated CD20+ follicular lymphoma
grade 1, 2, or 3a, FLIPI 2-5, ECOG ≤2, ≥ 18
Jahre
Mosunetuzumab + Lenalidomid vs.
monoklonalem Anti-CD20-Antikörper (mAb) +
Chemotherapie.
Ausschluss: vorherige Strahlentherapie,
Dauerimmunsuppression, aktive
Autoimmunerkrankung

Olympia-1 Phase 3
Odronextamab (REGN1979) x Anti-CD20 x
Anti-CD3 vs. Wahl des Prüfarztes bei zuvor
unbehandelten Patienten mit follikulärem
Lymphom.
≥ 18 Jahre, ECOG ≤2
Ausschluss: jegliche Vortherapie,
Dauerimmunsuppression, aktive
Autoimmunerkrankung

Peripheres T-Zell- Lymphom

SPI-BEL 301 Phase 3,
Kombination Bel-CHOP/ Fol-COP vs. CHOP
bei neu diagnostiziertem peripherem T-Zell-
Lymphom
≥ 18 Jahre, ECOG ≤2
Ausschluss: jegliche Vortherapie,
Dauerimmunsuppression, aktive
Autoimmunerkrankung

Hodgkin Lymphom

PREFer: Phase 2
18-75 Jahre
Anti PD-1-Antikörper Pembrolizumab in
Kombinaion mit Strahlentherapie
Ausschluss: keine Vortherapie, keine
vorherige Strahlentherapie,
Dauerimmunsuppression

Follikuläres Lymphom und Marginalzonenlymphom

Olympia-5 Phase 3
≥ 18 Jahre, ECOG ≤2
Odronextamab (REGN1979) x Anti-CD20 +
Anti-CD3-Antikörper + Lenalidomid vs.
Rituximab + Lenalidomid
Ausschluss: jegliche Vortherapie,
Dauerimmunsuppression, aktive
Autoimmunerkrankung

B-Zell-Lymphom (CAR-T-Zell-Therapie)

PRIME-CAR: Phase 2,
> 18, ECOG < 2
Fludarabin + Cyclophosphamid, AXI-CEL-Infusion
Ausschluss: mehr als eine Vortherapie, weitere
maligne Erkrankung,

DLBCL

MK2140-011: Phase 3
≥ 18 Jahre, ECOG ≤2
Treatment Group: Zilovertamab vedotin + R-CHP
Control Group: Polatuzumab vedotin + R-CHP
Ausschluss: keine Vortherapie, ndolente
Erkrankung, Dauerimmunsuppression,
PMBCL, Grauzonen-Lymphom, Ann-Arbor-
Stadium I

KONTAKT STUDIENZENTRUM

Study Nurse: Kristina Wolf, Tel.Nr.: -5314
Kristina.Wolf@mri.tum.de

Study Nurse: Hacer Taskin, Tel.Nr.: 5968
Hacer.Taskin@mri.tum.de