

FOLLIKULÄRES LYMPHOM

FORTplus Phase 3
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-2
Stadium I oder II, Grad 1, 2, 3a
Größter Lymphomdurchm. ≤ 7 cm
**Rituximab + st. dose 12x2Gy vs.
Obinutuzumab + low dose 2x2Gy
GAZAI vs. MIR**
Ausschluss: extranodaler Befall

MANTELZELL- LYMPHOM

MCL elderly III Phase 2
ED MZL Stadium II-IV, ungeeignet für
autologe SZT
Alter >60, ECOG ≤2
**VR-I: Venetoclax, Rituximab,
Ibrutinib vs. BR-I:
Bendamustine, Rituximab,
Ibrutinib**
Ausschluss: große OP <28 Tage

CLL

CLL16 Phase 3
ED CLL 17p Deletion, TP53 Mutation oder
komplexer Karyotyp erforderlich
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-2
**Obinutuzumab + Venetoclax ±
Acalabrutinib**
Ausschluss: Richter Transformation,
ZNS Beteiligung

PRIMÄRES ZNS- LYMPHOM

OptiMATe Phase 3
Alter 18-65 Jahre ECOG unabh. oder
66-70 Jahre + ECOG ≤ 2
**1x R-MTX + 2x MATRix + HD
vs 4x MATRix + HD**
Ausschluss: nicht primär ZNS,
GFR <60ml/min

KONTAKT STUDIENZENTRUM

Study Nurse: Kristina Wolf, Tel.Nr.: -5314
Kristina.Wolf@mri.tum.de

Study Nurse: Hacer Taskin, Tel.Nr.: 5968
Hacer.Taskin@mri.tum.de