

MPN - allgemein

aktuell keine Studien

CHRONISCHE MYELOISCHE LEUKÄMIE

aktuell keine Studien

PRIMÄRE MYELOFIBROSE

KRT-232-115 Phase 3 **Aktivierung Q2/2025**
PMF, Post-PV-MF oder Post-ET-MF, intermediate-1, 2 oder high-risk, mit suboptimalem Ansprechen auf Ruxolitinib
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG ≤ 2
Ausschluss: bis zu 28 Tage vor dem Screening - nicht auf die Milz gerichtete Strahlentherapie, PB oder KM Blasten $>10\%$,
nur Part A: Vortherapie mit JAK-, BCL-XL, BET, MDM2, PI3K, or XPO1 inhibitors; prior p53-directed therapy;
nur Part B: Verdoppelung der WBC während Monotherapie mit Ruxolitinib in Part A.
Therapie: Navtemadlin + Ruxolitinib vs Placebo + Ruxolitinib

GSK_220752 Phase 2 **Aktivierung Q2/2025**
Transfusionsabhängige Myelofibrose (PMF, Post-PV-MF oder Post-ET- MF)
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG ≤ 2
Ausschluss: entzündliche Darmerkrankung, Vortherapie mit ACVR1 Inhibitor, Splenectomie
Therapie: Momelotinib in Kombination mit Luspatercept

POLYCYTHAEMIA VERA

aktuell keine Studien

ESSENZIELLE THROMBOZYTHÄMIE

aktuell keine Studien

KONTAKT STUDIENZENTRUM

Prüfarzt: Dr. med Peter Herhaus
T: 089 – 4140 5649
Email: Peter.Herhaus@tum.de

Studienassistentin: Karin Struppler
Tel.Nr.: 089 – 4140 9714
Email: karin.struppler@mri.tum.de