

Ösophaguskarzinome/AEG/ Magenkarzinome

1. Linie

AbbVie M24-977 Phase 2

Lokal fortgeschrittenes, inoperables oder metastasiertes Adenokarzinom des Magens, gastroösophagealen Übergangs oder Ösophagus, PD-L1 Stratifizierung, HER2-
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-1
Stage 1: **Dosissteigerung - ABBV-400 + Budi 500 mg + 5-FU/LV**
Stage 2: **Dosisoptimierung (3 Arms) - ABBV-400 (Dosis 1 und 2) / Budi 500 mg; FOLFOX + Budi 500 mg**

Ausschluss: vorherige cMET, PD-1 oder PD-L1 Inhibitoren Therapie
[Aktivierung Q2/2025](#)

Daiichi Sankyo DC8201-724 Phase 3

Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes Magen- oder AEG-Adenokarzinom, HER2 +, keine systemische Therapie länger als 6 Monate nach der letzten Dosis (perioperative/neoadjuvante Therapie)
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-1
Arm M1: **T-DXd + 5-FU oder Capecitabine**
Arm M2: **Trastuzumab + platinum-based Chemotherapy + Pembrolizumab**
Arm E1: **T-DXd + 5-FU oder Capecitabine**
Arm E2: **Trastuzumab + platinum-based Chemotherapy**

[Aktivierung Q2/2025](#)

Kolorektale Karzinome

PROTECTOR / FIRE-10 Phase 3

kolorektales Karzinom T3-4 und/oder N+ ohne distante Metastasen
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-2
Arm A: **6 Zyklen mFOLFOXIRI/FOLFOX oder 4 Zyklen CAPOX -> OP**
Arm B: **OP -> Chemotherapie**
Ausschluss: vorherige Chemotherapie, instabile kardiale Arrhythmie > Grad 2, Ileus
[Aktivierung Q2/2025](#)

FUTURE-001 (Substudy bei FUTURE)

Phase 2
kolorektales Karzinom (unresektable, metastatisch oder rekurrent mit NRAS/KRAS, BRAF, MSI, PD-L1 Status), keine palliative Therapie (1 Linie)
Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-1
Futibatinib 20 mg + mFOLFOX6 + Tislelizumab 200 mg
Ausschluss: kuratives kolorektalen Karzinom, vorherige Therapie mit FGFR Inhibitoren, PDL-1, CTLA-1
[Aktivierung Q2/2025](#)

KONTAKT STUDIENZENTRUM

Sarah Lang
Tel.Nr.: +49 89 4140 5145
Sarah.Berger@mri.tum.de

Anna Osminina
Tel.Nr.: +49 89 4140 8175
Anna.Osminina@mri.tum.de